

2. Übung zu Kommunikationsnetze: Analyse und Leistungsbewertung

Prof. Dr. Rudolf Mathar, Simon Görtzen, Christoph Schmitz
2.5.2011

Aufgabe 1. Bei Ethernet nach IEEE 802.3 wird ein exponentieller Backoff-Algorithmus zur Auflösung von Kollisionen verwendet. Bevor ein Rechner mit der Datenübertragung beginnt, überprüft er zunächst, ob gerade kein anderer Rechner überträgt. Ist die Leitung frei, so wird sofort mit der Übertragung begonnen. Ist die Leitung jedoch belegt, so wird eine zufällige Zeit $T_1 \sim R(0, t)$ gewartet. Der Parameter $t > 0$ sei fest vorgegeben. Falls die Leitung nach der Wartezeit noch belegt ist, so wird erneut eine zufällige Zeit gewartet. Dieses wird maximal n mal wiederholt. Die Wartezeit nach dem i -ten Versuch sei verteilt gemäß $T_i \sim R(0, t \cdot 2^{i-1})$, $i = 1, \dots, n$.

In jedem Versuch sei der Kanal mit Wahrscheinlichkeit p belegt und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ frei. Der Backoff-Algorithmus wird entweder beendet, nachdem der Kanal frei ist und die Daten übertragen werden können oder nach dem n -ten Versuch mit einer Fehlermeldung, wenn der Kanal auch dann nicht frei ist.

- Charakterisieren Sie die Verteilung der Zeit W , die angibt, wann der Backoff-Algorithmus beendet wird, durch die zugehörige Laplace-Transformierte. Nehmen Sie dabei an, dass der Kanal belegt ist, wenn der Rechner zum Zeitpunkt Null seine Übertragung beginnen will, d.h., es wird zu Beginn auf jeden Fall die Zeit T_1 gewartet.
- Bestimmen Sie den Erwartungswert von W .
- Welche erwartete Wartezeit ergibt sich, wenn der Kanal zu Beginn der Übertragung nur mit Wahrscheinlichkeit p belegt ist?
- Welche Verteilung ergibt sich, wenn die Wartezeiten T_i gemäß einer Exponentialverteilung mit mittleren Wartezeiten wie oben gewählt werden?

Aufgabe 2. Eine Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(c-a)(b-a)}, & a \leq x \leq b \\ \frac{2(c-x)}{(c-a)(c-b)}, & b < x \leq c \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt dreiecksverteilt mit Parametern $a < b < c$.

- Bestimmen Sie die Laplace-Transformierte von X für $a \geq 0$.
- Existiert $E(e^{-sX})$ für beliebiges $a < 0$?